

Partes clave de NEC-Zero incluyen:

1. Alimentación con leche materna
2. Ayudar al equipo a reconocer la NEC a tiempo mediante una escala llamada GutCheckNEC
3. Limitar el número de días de tratamiento antibiótico que se da después del nacimiento
4. Promover que la alimentación con protocolos definidos sea en equipo
5. Evitar los antiácidos



Preguntas que puede hacer

Fotografía: William Nyberg y Tanya Clay

Última revisión marzo, 2018©



THE UNIVERSITY OF ARIZONA
COLLEGE OF NURSING
NEC-Zero

Recursos de apoyo

NEC Society

necsociety.org/resources

Hand to Hold

handtohold.org


The Morgan Leary Vaughan Fund

morgansfund.org



NEC-Zero es una intervención en equipo que tiene como meta la prevención y mejora del diagnóstico temprano de la NEC.

Para más información visite
neczero.nursing.arizona.edu



¿Qué es la enterocolitis necrotizante



¿Qué es la enterocolitis necrotizante?

La enterocolitis necrotizante es una enfermedad donde partes del tejido de los intestinos se muere (necrosis). Esto puede causar que el intestino se rompa y que la infección vaya por todas partes del cuerpo.

Los lactantes que desarrollan NEC (como le dice a la enterocolitis necrotizante por sus siglas en inglés) son en su mayoría los que nacen antes de las 32 semanas de embarazo, pero la NEC se también se puede presentar en lactantes que nacieron a tiempo (a término).

Las probabilidades de que su bebé desarrolle NEC son bajas. Sin embargo, la NEC es grave y a veces causa la muerte.

¿Cómo sucede la NEC?

Hay muchos factores que contribuyen:

- Un sistema inmunitario inmaduro (no bien desarrollado)
- Un intestino débil
- Alimentación con leche maternizada (formula). Los bebés que reciben leche materna tienen menor riesgo de desarrollar NEC
- Falta de oxígeno

Síntomas

Signos a los que debe prestar atención:

- Sangre (en el popó) en el pañal
- Un estómago hinchado o inflamado, de color rojo o gris y que duele cuando se le toca
- El bebé deja de respirar (apnea)
- Latidos cardiacos lentos (bradicardia)
- Temperatura muy baja o muy alta
- Menos actividad o cambios en el comportamiento
- No digiere bien los alimentos

Tratamiento para la NEC

Después del diagnóstico, el tratamiento empieza inmediatamente e incluye:

- Detener toda la alimentación
- Se introduce un tubo en el estómago para drenar el aire y líquido
- Rayos-X
- Antibióticos
- A veces, se realiza una cirugía



Recuperación

Se dan nutrición y líquidos por vía intravenosa (por la vena) mientras que el intestino se recupera. El doctor de su bebé decidirá cuándo y cómo reiniciar la alimentación. Los bebés se recuperan de forma diferente de la NEC. Algunos bebés se recuperan y otros tendrán problemas de salud a largo plazo (por mucho tiempo) y algunos pueden morir. Si se pierde demasiado intestino, esto puede causar complicaciones de salud a largo plazo como alergias, síndrome del intestino corto, falla orgánica entre otros.